

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当たりの使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	
				薬量 (mℓ)	希釈水量 (L)				
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布 50~100	3回 以内		3回 以内	
		多年生雑草		500~1000					
かんきつ		一年生雑草		250~500	通常散布 50~100 少量散布 25~50			3回 以内	5回 以内
		多年生雑草		500~1000					
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	2回 以内	3回 以内		
		多年生雑草		500~1000					
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	2回 以内	3回 以内		
		多年生雑草		500~1000					
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	1回	1回		
		多年生雑草		500~1000					
水田作物 (水稲を除く)	-	一年生雑草	耕起20~10日前 まで (雑草生育期)	250~500	50~100	1回	2回以内		
移植水稲									
直播水稲									
麦類(小麦を除く)			耕起7日前まで (雑草生育期)	500~750	3回 以内	3回以内			
小麦			耕起7日前まで (雑草生育期)						
雑穀類			多年生雑草	500~750		2回以内			
野菜類(だいこん、えだまめ、 ねぎ、たまねぎ、 トマト、きゅうり、 なす、アスパラガス、 オリーブ(葉)、 しゃくやく(薬用)、 しゃくやく(薬用)、 たらのき、びわ(葉)、 ほうれんそう、 レタス、とうがらし類、 にんじん、ピーマン、 薬用にんじんを除く)							1回		
とうがらし類 にんじん ピーマン だいこん				耕起7日前まで (雑草生育期)		100	1回	2回以内	
アスパラガス オリーブ(葉) しゃくやく(薬用) たらのき びわ(葉) ほうれんそう レタス トマト きゅうり なす								3回以内	
薬用にんじん								10回以内 (1年間に 2回以内)	
ねぎ		一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250~500	少量散布 25~50				
			収穫14日前まで (雑草生育期: 定植後畝間処理)		50~100				

雑草茎葉散布

たまねぎ			耕起7日前まで (雑草生育期)		100	3回 以内		3回 以内
			耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)		少量散布 25~50			
えだまめ			耕起7日前まで (雑草生育期)		100	2回 以内		2回以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)		少量散布 25~50			
豆類(種実、 ただし、だいず、 らっかせいを除く)			耕起前又は は種前まで (雑草生育期)		少量散布 25~50	2回 以内		4回以内
			は種10日以前 (雑草生育期)					
だいず			は種後出芽前まで (雑草生育期)		100	1回		1回
			耕起前又は 植付前まで (雑草生育期)					
いも類 (かんしょを除く)			耕起前 (雑草生育期)		少量散布 25~50	1回		2回以内
かんしょ			摘採7日前まで (雑草生育期)					
茶			収穫30日前まで (雑草生育期)	500~1000				6回以内
さとうきび	圃場内の 周縁部	多年生雑草						
飼料用 とうもろこし	—	一年生及び 多年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	2回 以内		2回以内
			は種後出芽前 まで (雑草生育期)					
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生雑草	更新・造成の 10日以前 (雑草生育期)	500~1000	50	2回 以内		3回以内
		多年生雑草						
		一年生及び 多年生雑草	は種10日前~ は種当日 (耕起整地後) (雑草発生揃期)	250~500				
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類等の 多年生雑草	生育盛期以降 (夏~秋期)	1000	30	1回	雑草木 茎葉 散布	1回
		落葉雑かん木						
つつじ類 つばき類	—			250~500	50~100	4回以内	雑草 茎葉散布	4回以内
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500	100	3回 以内	植栽地を 除く 樹木等の 周辺地に 雑草 茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		1000				
		スギナ		2000	50~100			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
					つる径 (cm)	使用量 (mL/株)			
林木	林地	クズ・フジ等のつる類	生育初期	原液又は2倍液	2cm以下	0.5mL/株	1回	つる注入処理	1回
		落葉雑かん木	生育期 (5~10月)		2.1~3.0cm	1.0mL/株			
	樹径(cm)				力所数	3.1~4.0cm		1.5mL/株	
林地 放置竹林	竹類	夏期	原液	5.1cm以上	2.0mL/株 適宜増量	1mL/カ所	立木注入処理		
					10cm以下	2~3			
					10~20cm	4~8			
					20cm以上	10		竹稈注入処理	